



CLEAR-ALIGNER®



Casos clínicos
Volumen #5

Case Reports
Volume #5



CLEAR-ALIGNER®

Los casos expuestos han sido realizados por el Dr. Pablo Echarri. El trabajo de laboratorio ha sido realizado por el laboratorio Ladent, y se han utilizado los materiales del Scheu Dental Technology.

All cases were carried out by Dr. Pablo Echarri. All the laboratory work was carried out by Ladent laboratory, and the Scheu Dental Technology materials were used.

© 2012 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL

© 2012 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL

Todos los derechos reservados.

All rights reserved

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado o grabado por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el permiso escrito previo de los editores.

This book or any part thereof may not be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission of the publishers.



CLEAR-ALIGNER®

CASO 1

Ref. 00786 – Caso con apiñamientos y mordida profunda anterior. Tratado con Clear Aligner de expansión oblicuo-lateral y de intrusión.

CASE 1

Ref. 00786 – Crowding case with anterior deep bite. Treated with Clear Aligner for oblique-lateral expansion, and for intrusion.

Antes/Before



Después/After



CASO 2

Ref. 01566 – Caso con apiñamientos tratado con Clear Aligner – arcada superior: 6 pasos con expansión oblicuo-lateral; arcada inferior: 6 pasos con expansión oblicuo-lateral.

CASE 2

Ref. 01566 – Crowding case treated with Clear Aligner – maxilla: 6 steps with oblique-lateral expansion; mandible: 6 steps with oblique-lateral expansion.

Antes/Before



Después/After





CLEAR-ALIGNER®

CASO 3

Ref. 01051 – Caso con apiñamientos tratado con Clear Aligner – arcada superior: 8 pasos con expansión oblicuo-lateral; arcada inferior: 6 pasos con expansión oblicuo-lateral.

CASE 3

Ref. 01051 – Crowding case treated with Clear Aligner – maxilla: 8 steps with oblique-lateral expansion; mandible: 6 steps with oblique-lateral expansion.

Antes/Before



Después/After





CASO 4

Ref. 00636 – Caso con apiñamientos y el canino superior izquierdo intruido. Fue tratado con expansión oblicuo-lateral y luego se corrige el canino con un CA Forced Extrusion. Arcada superior: 6 pasos de expansión oblicuo-lateral y CA FE para el canino superior izquierdo. Arcada inferior: 5 pasos de expansión oblicuo-lateral.

CASE 4

Ref. 00636 – Crowding case with intruded upper left canine. It was treated with oblique-lateral expansion and the canine was corrected with CA Forced Extrusion. Maxilla: 6 steps with oblique-lateral expansion and CA FE for the upper left canine. Mandible: 5 steps with oblique-lateral expansion.

Antes/Before



Después/After



CASO 5

Ref. 00480 – Caso con diastemas en la arcada superior, tratado con 4 pasos de CA.

CASE 5

Ref. 00480 – Case with spacing in maxilla, treated with 4 CA steps.

Antes/Before



Después/After





CLEAR-ALIGNER®

CASO 6

Ref. 00953 – Caso con apiñamientos. Arcada superior: 6 pasos con expansión oblicuo-lateral; arcada inferior: 6 pasos con expansión y stripping. Se hizo el blanqueamiento después del tratamiento.

CASE 6

Ref. 00953 – Case with crowding. Maxilla: 6 steps with oblique-lateral expansion; mandible: 6 steps with expansion and stripping. Teeth bleaching was carried out after the treatment.

Antes/Before



Después/After



CASO 7

Ref. 01384 – Caso con diastemas que fueron tratados con Clear Aligner y a continuación se realizó la reconstrucción de los incisivos superiores microdóncicos.

CASE 7

Ref. 01384 – Case with spacing. After the treatment with Clear Aligner, the reconstruction of the microdentic upper lateral incisors was carried out..

Antes/Before



Después/After





CLEAR-ALIGNER®

Reconstrucción del 12 y 22 microdóncicos
Reconstruction of microdontic 12 and 22





CLEAR-ALIGNER®

CASO 8

Ref. 00412 – Caso de recidiva en alineación de incisivos inferiores.
2 pasos de Clear Aligner y retención doble (retención fija más CA de .040”).

CASE 8

*Ref. 00412 – Relapse case of lower incisors alignment.
2 steps of Clear Aligner and double retention (fixed retention, plus .040” CA).*

Antes/*Before*



Después/*After*





CLEAR-ALIGNER®
